

# KARCINOM GRLIĆA JE IZLEČIV UKOLIKO SE NA VREME OTKRIJE

**Obavezno uradite i papa test i kolposkopiju HPV infekciju otkriti u svim njenim fazama Sumnjive promene uklonite radiotalasnom loop excizijom**

Na osnovu mnogobrojnih ispitivanja koja su donela važna saznanja možemo slobodno reći da karcinom cerviksa kao i sve njegove predaze predstavljaju bolest infektivne prirode.

HPV virus je glavni faktor, ali ne dovoljan da bi promena nastala. Nesumnjivo je da u nastanku promena moraju da postoje dva faktora. Prvi faktor je taj koji treba da dovede virus do grlića i omogući mu da ispolji svoje kancerogeno dejstvo.

Stalni hronični iritirajući faktori na grliću materice, pogotovo u adolescentnom periodu dovešće do takozvanog procesa metaplazije koja u narednom periodu postaje ulazno mesto za HPV virus.

## Šta je uzrok ranog kontakta sa HPV virusom?

Rano stupanje u seksualne kontakte, česte promene seksualnih partnera, promiskuitet muškog partnera, loša polna higijena, hormonska kontracepcija su samo neki od glavnih uzroka koji dva pomenuta faktora spajaju u jednu riziko celinu koja kao krajnji rezultat ima neku od premalignih promena ili sam karcinom grlića materice.

## Otkrijmo promenu na vreme. Kako?

Kod preko 50% žena pri pregledu nalazimo ektopiju ili, kako žene obično govore, ranicu na grliću materice. To je apsolutno netačan izraz, jer ektopija nije oštećenje tkiva što bi u suštini trebalo da predstavlja pojam ranica. Crvena boja koja se vidi pri pregledu i proglašeni laički ranićom potiče u stvari od cilindričnog epitela iz cervikalnog kanala koji je crvene boje i koji je tu dospelo zbog uticaja nekog od gore pomenutih riziko faktora. Promena kao takva nije opasna, ali bez sumnje njeno dugo postojanje dovodi do procesa metaplazije i povećava rizik da HPV virus ispolji svoje kancerogeno dejstvo.

Papa test nije dovoljan, jer je njegova tačnost do 65%.

Kolposkopski pregled povećava dijagnostičku sigurnost do gotovo 90%.

Kolposkopija nam pruža i apsolutnu sigurnost u otkrivanju subkliničkih formi kondiloma koji se prezentuju kao beličaste perlice na sluzokoži malih usana sa centralnim krvnim sudom ili kao talasasta beličasta zadebljanja sluzokože usana i lateralnih zidova vagine kada obično govorimo o kondilomatoznom vulvitisu. Ovakvi kolposkopski nalazi u suštini predstavljaju rezervoare HPV virusa odakle se virus prenosi na grlić materice.

Ispod papa II nalaza može se kriti neka od prekanceroznih promena kao i karcinom grlića materice.

Nekad čak i kolposkopski ne tako ubedljiva promena ispod sebe krije karcinom grlića.

Patohistološkom analizom sumnjive promene uzete metodom radiotalasne loop excizije postavlja se konačna dijagnoza promene na grliću materice.

## Šta pacijentkinja dobija loop excizijom?

Radiotalasna loop excizija je za razliku od bopsije bezbolna. Pri loop exciziji u stanju smo da promenu otklonimo u potpunosti sve do zdravog tkiva čime smo loop exciziju učinili ujedno i terapijskom metodom ukoliko histopatološka nalaze ne pokaže težu promenu (CIN II ili CIN III) kada je obično potrebno, ukoliko je promena dublja, nastaviti terapiju (konizacija). Krvarenje je retko i minimalno za razliku od biopsije, a stepen destrukcije grlića je izuzetno mali, tako da nema ožiljavanja sa suženjem cervikalnog kanala što je jako bitno za mlade devojkice koje nisu rađale.

Prema tome, radiotalasna loop excizija nam sa jedne strane daje veliku dijagnostičku sigurnost tako da nam ne može promaći ni najmanja promena, a sa druge strane ukoliko se ne radi o teškim promenama poput CIN III i karcinoma, mi dobijamo i fantastičan i jednostavan terapijski efekat.



Specijalistička ginekološko akušerska ordinacija


- + RANO OTKRIVANJE I PREVENCIJA KARCINOMA GRLIĆA MATERICE**
  1. PAPANIKOLAU
  2. KOLPOSKOPIJA
  3. **RADIOTALASNA LOOP EXCIZIJA** (najsavremenija dijagnostičko-terapijska metoda)
- + RADIOTALASNO UKLANJANJE KONDILOMA KOD ŽENA I MUŠKARACA**
- + RADIOTALASNO UKLANJANJE KONDILOMA KOD TRUDNICA I ADOLESCENTKINJA**
- + RADIOTALASNO UKLANJANJE KONDILOMA KRITIČNIH LOKALIZACIJA (analni, uretarni otvor, grlić materice)**
- + RADIOTALASNO UKLANJANJE MEKIH FIBROMA I VISEĆIH BRADAVICA**
- + STERILITET**
- + TRUDNICE, CTG**
- + KONTRACEPCIJA, MENOPAUZA**
- + KOMPLETAN ULTRAZVUČNI PREGLED**
- + KOMPLETAN PREGLED DOJKE**



Promena na grliću koja zahteva radiotalasnu LOOP exciziju



3 minuta nakon radiotalasne LOOP excizije. Promena uklonjena i u dubinu i u širinu



Grlić uredno zarastao 8 nedelja nakon LOOP excizije. HP nalaz govori u prilog CIN I (condylomi na grliću)

Zemun, Dubrovačka 3

(centar, kod McDonalds-a)

Radno vreme:

ponedeljak-petak od 10 do 20h

telefon za zakazivanje

011/ 3163 074