

POLNE BRADAVICE (KONDILOMI) KOD ADOLESCENATA I TRUDNICA

HPV (humani papiloma virus)

IZAZIVAČ KONDILOMA - OPASNOST ZA GRLIĆ

Kondilomi su seksualno prenosiva bolest. Starosna granica obolevanja se sve više spušta, tako da je danas kod devojaka najveća zastupljenost obolelih između 19. i 22. godine, a kod muškaraca između 22. i 26. godine života.

U ovoj životnoj dobi pojava kondiloma izaziva osećaj velike psihičke opterećenosti praćen jednom neodgovornošću mladih ljudi prema sopstvenom zdravlju. Takav način razmišljanja usloviće upravo suprotan efekat, pa će ovo izuzetno infektivno oboljenje izazvano HPV virusima preći u stadijum koji je daleko složeniji i komplikovaniji za lečenje.

Kada to kažemo mislimo prvenstveno na prenos HPV infekcije na grlić materice mlade devojke koja nije rađala. Takva infekcija će bez sumnje ostaviti svog traga. Iskustvo govori da gotovo u 90% slučajeva kolposkopskim pregledom grlića devojke koja ima spoljne kondilome nalazimo i znake virusne infekcije unutrašnjosti vagine i grlića materice. Definitivnu potvrdu dobijamo radiotalasnom loop excizijom sumnjivog mesta na grliću materice.

Do prenosa infekcije dolazi u toku seksualnog čina kada virus ulazi kroz mikro traume na genitalnim organima. Mogućnost infekcije je velika već pri prvom kontaktu sa zaraženom osobom i ide i više od 35%. U toku drugog nezaštićenog odnosa infekcija se prenosi gotovo u 100% slučajeva. Kod muškaraca je imunitet mnogo jači, pa često i nemamo klinički manifestne promene na genitalnim organima, ali to ne znači da oni nisu izvor virusa.

Ovo je bitno znati jer je kod devojaka infekciju moguće otkriti baš u stadijumu kada oni nisu klinički vidljivi golim okom, ali se kolposkopskim pregledom jasno prikazuju. Dijagnostikovanje kondiloma kolposkopskim pregledom i njihovo uklanjanje u početnoj fazi gotovo da onemogućava prenos HPV infekcije na grlić.

Kod trudnica moramo paziti i na plod i na majku. Stavovi su različiti. Činjenica da se infekcija može preneti na plod i iskomplikovati porođaj nas upućuje na to da je kondilome indikovano uklanjati u trudnoći. Radiotalasna hirurgija je ta koja nam pruža pun komfor i sigurnost, jer je apsolutno neškodljiva za plod, a terapijski efikasna za majku. To su upravo činjenice koje nas navode da za kondilome u trudnoći nema dileme, već je njihovo uklanjanje terapijski izbor.

Zašto su radiotalasi terapija izbora?

Nikako ne smemo zaboraviti činjenicu da su genitalni organi jako osetljivo područje na bilo koji oblik nasilne traume, bilo da je ona mehaničkog ili termičkog porekla. Upravo je to razlog što u pomenutom slučaju (adolescenti, trudnice) loše odabrana metoda i loše dozirana destrukcija genitalnog tkiva ostavlja za sobom ožiljke sa pratećim posledicama poput suženja vagine i cervikalnog kanala. Ako tome dodamo i činjenicu krajnje osetljivih lokalizacija poput analne i perianalne regije, predvorja vagine i glansa penisa kod muškaraca što je i tema ovog teksta, tada je na nama još veći stepen odgovornosti

Za razliku od drugih (termokauter, laser) radiotalasna tehnika nam nudi sve ono za čim smo tragali u terapiji kondiloma kod adolescenata i trudnica!

1. Intervencije se izvode samo u lokalnoj anesteziji bez obzira na lokalizaciju, njihovu rasprostranjenost, starost pacijenta i fiziološko stanje organizma.

2. Oštećenje okolnog zdravog tkiva je minimalno, a mesta sa kojih su uklonjeni kondilomi su bez opekotina i karbonifikacije.

3. Dobra preglednost u toku intervencije, minimalno krvarenje, pruža nam priliku da se promene u potpunosti uklone.

4. Oporavak izuzetno brz, bez obzira na rasprostranjenost i lokalizaciju, nema ožiljaka, a vraćanje u normalan seksualni život nakon dve nedelje.

5. Metoda izbora za lečenje kondiloma u trudnoći i za one sa perianalnom i analnom lokalizacijom.

6. Step en recidiva ispod 5%.

Sve gore navedeno predstavlja dovoljan razlog da se u terapiji polnih bradavica isključivo opredelimo za radiotalasnu tehniku kao metodu izbora.

Ipak treba navesti da je za ispravan i efikasan rad potrebno iskustvo u radiotalasnoj hirurgiji kako bi sve pomenute prednosti bile maksimalno iskorišćene.



Specijalistička ginekološko akušerska ordinacija

- +** RANO OTKRIVANJE I PREVENCIJA KARCINOMA GRLIĆA MATERICE
 1. PAPANIKOLAU
 2. KOLPOKOPIJA
 3. RADIOTALASNA LOOP EXCIZIJA (najsavremenija dijagnostičko-terapijska metoda)
- +** RADIOTALASNO UKLANJANJE KONDILOMA KOD ŽENA I MUŠKARACA
- +** RADIOTALASNO UKLANJANJE KONDILOMA KOD TRUDNICA I ADOLESCENTKINJA
- +** RADIOTALASNO UKLANJANJE KONDILOMA KRITIČNIH LOKALIZACIJA (analni, uretarni otvor, grlić materice)
- +** RADIOTALASNO UKLANJANJE MEKIH FIBROMA I VISEĆIH BRADAVICA
- +** STERILITET
- +** TRUDNICE, CTG
- +** KONTRACEPCIJA, MENOPAUAZA
- +** KOMPLETAN ULTRAZVUČNI PREGLED
- +** KOMPLETAN PREGLED DOJKE

Zemun, Dubrovačka 3
(centar, kod McDonalds-a)

Radno vreme:

ponedeljak-petak od 10 do 20h
telefon za zakazivanje

011/ 3163 074



suspekti kondilomi na grliću materice



6 nedelja posle radiotalasne terapije



težak oblik kondiloma kod adolescentkinje



6 nedelja nakon radiotalasne terapije bez recidiva i ožiljaka



analni kondilomi kod muškarca pre



6 nedelja nakon radiotalasne terapije bez recidiva i ožiljaka